

 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.	PROTOKOL DEKONTAMINÁCIE MRSA	
---	-------------------------------------	---

PRACOVISKO: DETSKÉ KARDIOCENTRUM

Prípravok PRONTODERM foam

Umývanie vlasov: na vlasy naniesť penu Prontoderm foam a nechať zaschnúť.

Tvár: Tvár umyť dôkladne roztokom Prontoderm foam pomocou štvorcov. Všetky časti tváre musia byť roztokom dôkladne zvlhčené. Očné kútiky a viečka pozorne očistiť tým istým štvorcom. Očistené a dekontaminované časti nechať voľne uschnúť. Nezmývať. Štvorec potom znehodnotiť.

Horná časť tela: Od krku nadol vrchnú časť tela umývať čistým štvorcom napusteným roztokom Prontoderm foam a nechať uschnúť. Nezmývať.

Dolná časť tela: Dolnú časť tela taktiež umývať čistým štvorcom napusteným roztokom Prontoderm foam. Podľa potreby použiť viacero štvorcov. Nechať uschnúť. Nezmývať.

Uši: Vonkajšie časti uší vyčistiť vatovými tyčinkami mierne navlhčenými roztokom Prontoderm foam a nechať uschnúť. Nezmývať. Upozornenie: nenavlhčiť príliš. Roztok Prontoderm foam sa nesmie tak ako iné roztoky dostať do zvukovodu.

Prípravok PRONTORAL

Ústna hygiena: Na výplach ústnej dutiny a hltanu použite roztok Pront Oral. Intenzívna ústna hygiena 3 x denne klokať s 10ml neriedeného roztoku Pront Oral cca 60 sekúnd, vyplúť a opätovne nevyplachovať ústnu dutinu. Neprehĺtať. U novorodencov, kojencov a malých detí povytierať dutinu ústnu špongiou na dutinu ústnu namočenou v roztoku ProntOral.

Prípravok PRONTODERM gél light

Nos: Nos dôkladne vyčistiť navlhčenou vatovou tyčinkou. Čistenie nosa vykonať viackrát denne minimálne ráno, na obed a večer, aby sa v nose netvorili žiadne usadeniny, čím sa zabráni vzniku vhodnej pôdy pre tvorbu choroboplodných zárodkov. Špeciálnu starostlivosť treba venovať vestibulum nasi. Nos vytierať na striedanie s BACTROBAN ung. 3x denne.

Ostatné predmety (okuliare, šperky, protézy atď.): je možné na povrchu dekontaminovať opláchnutím roztokom **Prontoderm foam** al. **Meliseptol utierkami**. Z plastov je potrebné roztok po cca 5min. pôsobenia opláchnuť čistou teplou vodou.

Dezinfekcia okolia: Súčasne s dekontamináciou pacienta by mala prebiehať dezinfekcia všetkých vodorovných plôch v izbe pacienta **Meliseptol utierkami** určenými na plošnú dezinfekciu (čím sa zníži riziko opätovnej kontaminácie).

Po 3 dňoch skontrolujte kultivácie. Pri pozitívnych výsledkoch postup opakovať.

Obmedzte kontakt s pacientom počas dekontaminácie na minimum.